



服用支援  
ゼリー

eジュレ

オレンジ

使用方法


(イージュレ)

開封前には本体をよく揉んでご使用ください。よく揉むことでゼリーがまろやかになり薬を包みやすくなります。

## eジュレ・eジュレSTの場合

### ■容器に出して飲む場合

- ①薬を容器(小皿や湯のみ茶碗等)に入れます。




※底が浅く曲面のものがおすすめ。

- ②開封前には、よく揉んでください。



- ③切り口から斜め上に切り取り、開封してください。



- ④薬の上からゼリーを入れてください。



- ⑤薬を包みこむようにスプーンで混ぜてください。



- ⑥ゼリーが薬全体を覆った状態でお飲みください。




※ゼリーの使用量は薬の錠数に応じて調整してください。

### ■スプーンに出して飲む場合

- ①開封前には、よく揉んでください。



- ②切り口から斜め上に切り取り、開封してください。



- ③スプーンにゼリーを出し、薬をのせて、さらにゼリーを出して重ねます。



- ④ゼリーが薬全体を覆った状態でお飲みください。




※粉末や顆粒の場合はオブラートに包んで、のせてください。



時間をおくと、オブラートが溶け出す恐れがあります。

STの場合




余った分はクリップ等でしっかり止め、早目にご使用ください。

## eジュレCPの場合

### ■容器に出して飲む場合

- ①薬を容器(小皿や湯のみ茶碗等)に入れます。



※底が浅く曲面のものがおすすめ。

- ②開封前には、よく揉んでください。



- ③キャップをねじり取り外してください。



- ④取り付ける場合はキャップの上下を逆にして取り付けてください。



- ⑤薬の上からゼリーを入れてください。



- ⑥薬を包みこむようにスプーンで混ぜてお飲みください。



※ゼリーの使用量は薬の錠数に応じて調整してください。

### ■スプーンに出して飲む場合

- ①開封前には、よく揉んでください。



- ②キャップをねじり取り外してください。



- ③取り付ける場合はキャップの上下を逆にして取り付けてください。




- ④スプーンにゼリーを出し、薬をのせて、さらにゼリーを出して重ねます。



- ⑤ゼリーが薬全体を覆った状態でお飲みください。



※粉末や顆粒の場合はオブラートに包んで、のせてください。



時間をおくと、オブラートが溶け出す恐れがあります。



株式会社モリモト医薬

お客様相談室  
フリーダイヤル

0120-600-937 (平日のみ 9:00~17:00)

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 5-8-28 Tel.06-6476-5473 Fax.06-6476-5573

http://www.morimoto-iyaku.jp E-mail customer@m-ph.co.jp

